


Vigilancia de la gripe en España Semana 01/2006 (1 al 7 de enero de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la primera semana del nuevo año se han enviado a los laboratorios 18 muestras centinela. La Comunidad Autónoma de La Rioja ha notificado el aislamiento del virus de la gripe (tipo B) en una muestra centinela correspondiente a la semana 52. El aislamiento notificado la semana pasada procedente de Asturias, muestra también centinela, ha sido tipado como A/H1. Por otra parte, el virus tipo B aislado en Baleares en la semana 47 (procedente de una muestra no centinela) ha sido caracterizado genéticamente por el CNM, y se agrupa dentro del linaje Victoria. La cepa vacunal incluida en la vacuna de la temporada 05-06 para el hemisferio norte es una B/Shangai/361/02-"like", situada en el linaje Yamagata.

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes centinelas que han remitido información hasta el momento señalan niveles bajos de actividad gripal. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana (22,53 por 100.000 habitantes) se mantiene por debajo de los niveles basales.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La actividad clínica de la gripe es baja en toda Europa. Se ha notificado una actividad gripal esporádica en Inglaterra, Francia, Irlanda, Holanda, Noruega y Suiza en la semana 52/2005.

Tanto el tipo A como el B han sido aislados en Europa desde la semana 40/2005: el 54% de los aislamientos fueron A y el 46% fueron gripe tipo B. El número semanal de aislamientos es bajo, confirmando la baja actividad clínica. La distribución por subtipos de todos los aislamientos (centinela y no centinela) en Europa hasta la semana 52/2005 (N=166) es la siguiente: 59 (36%) gripe tipo A (no subtipado), 18 (11%) A(H3) [de los cuales nueve son A(H3N2)], 12 (7%) A(H1) [de los cuales tres son A(H1N1)] y 77 (46%) gripe tipo B.

No se han notificado casos humanos de gripe aviar en los 28 países que participan en el EISS. En Turquía, dos niños que murieron en la semana 1/2006 han sido diagnosticados de gripe aviar H5N1. Otros 13 casos están pendientes de ser confirmados por el laboratorio de referencia de la OMS en el Reino Unido.