

## Vigilancia de la gripe en España Semana 11/2006 (12 al 18 de marzo de 2006)

**Grupo de Vigilancia de la Gripe**  
**Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**  
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología


**Resultados de Laboratorio:** Una amplia mayoría de laboratorios del sistema han notificado aislamientos de virus de la gripe en la semana 11/2006. En la siguiente tabla quedan recogidos, desde el inicio de la temporada, los aislamientos semanales procedentes de las muestras centinela y no centinela. De un total de 456 virus aislados hasta el momento en el conjunto del territorio vigilado, 236 (52%) son tipo A y 219 (48%) son tipo B. De las 100 muestras tipo A que han sido subtipadas, 85 son (AH1N1) (85%), y 25 son A(H3N2) (25%).

**Tabla. Aislamientos de virus de la gripe globales. Temporada 2005-2006.**

			A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
2.005	Semana	40-52	0	0	2	2	4	0	0	3
2.006	Semana	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	1	1	0	0	0	0	0
		3	0	0	4	4	1	0	1	0
		4	0	0	3	2	5	0	0	1
		5	0	0	2	4	2	0	0	5
		6	3	0	11	8	3	0	2	8
		7	4	0	11	17	0	0	2	12
		8	10	4	17	25	2	1	0	4
		9	24	2	12	33	8	1	0	12
		10	32	5	10	40	11	1	2	6
		11	27	0	5	32	1	0	0	1
		Total	100	12	78	167	37	3	7	52

**Sistemas Centinela:** En la figura exponemos los datos de incidencia de gripe en el territorio sujeto a vigilancia, por períodos semanales, para la temporada anterior y la actual. También quedan recogidos los aislamientos centinela de virus de la gripe en la temporada actual. La actividad gripal sigue manifestándose de forma heterogénea en España, con niveles de actividad moderados en la zona Norte, Centro e Islas Canarias, y bajos en el resto del territorio vigilado. Esta disparidad regional se manifiesta, en el mismo sentido, en la intensidad de la circulación viral. Los niños y adultos jóvenes registran las mayores incidencias de la enfermedad. La tasa global de incidencia notificada de gripe (167,38 casos por 100.000 habitantes) sigue dibujando la fase de ascenso de la onda epidémica de esta temporada.

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 10/2006, quince de los 20 países europeos integrados en el EISS han notificado un nivel medio de actividad gripal. En Dinamarca, Alemania, Irlanda, Polonia y España la actividad gripal ha aumentado esta semana, con respecto a la semana anterior, mientras que en otros países continua el descenso iniciado en semanas previas (Ej: Inglaterra, Francia, Holanda). La difusión de la enfermedad es desigual en Europa. Cinco países notifican un nivel de difusión epidémico, España y Alemania, regional, y el resto esporádica o nula. Desde el inicio de la temporada, se observa una mayor presencia de virus tipo B (67% de los aislamientos) que de tipo A (33%). Del total de aislamientos de virus A, un 67% fueron A no subtipados, un 17% AH1 y un 16 % AH3. Ninguno de los 28 países que participan en EISS ha notificado casos humanos de gripe A(H5N1).