


Vigilancia de la gripe en España Semana 48/2006 (26 de noviembre al 2 de diciembre de 2006)

**Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la presente semana de vigilancia se han enviado 41 muestras centinela a los laboratorios del sistema. Tres de ellos han comunicado aislamientos y/o identificaciones de virus de la gripe: Baleares (1A); Cataluña (1A, 1B) y La Rioja (1 AH3N2), todos ellos en muestras centinela. Desde el comienzo de la temporada se han notificado un total de 12 aislamientos procedentes de muestras centinela y no centinela: 11 corresponden a virus de la gripe A (2 de ellos AH3N2) y uno corresponde a virus de la gripe B. El primer aislamiento de la temporada de virus de la gripe B se ha notificado esta semana 48/2006 por el laboratorio de Cataluña y procede de una muestra centinela.

Sistemas Centinela: En la semana 48/2006, al cierre de esta edición, todas las redes centinela que integran el Sistema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información. En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal se mantiene baja en todas las redes centinela que integran el sistema. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 48/2006 es de 22,41 por 100.000 habitantes. En la distribución por grupos de edad las mayores incidencias se han registrado en los menores de 15 años.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La actividad gripal se mantiene en Europa en un nivel bajo, habitual en esta época del año. Hasta la semana 47/2006 sólo se han notificado aislamientos esporádicos de virus de la gripe con predominio de circulación del tipo A. Sobre un total de 68 aislamientos comunicados por 16 redes centinela europeas, 52 (76%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 6 (13%) a virus AH1 (de los que dos son AH1N1), 5 (7%) a virus de la gripe AH3 (de los que cuatro son AH3N2) y 3 (6%) a virus de la gripe B. De los 5 aislamientos caracterizados antigénicamente y/o genéticamente, uno ha sido similar a A/New Caledonia/20/99(H1N1), tres similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2) y uno similar a A/California/7/2004(H3N2).