

Vigilancia de la gripe en España Semana 52/2006 (24 al 30 de diciembre de 2006)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 52/2006, se han notificado dos aislamientos de virus de la gripe A y uno de virus de la gripe A(H3N2), por la red de Asturias y del País Vasco, respectivamente, todos procedentes de muestras centinela. Desde el comienzo de la temporada se ha registrado un total de 27 aislamientos: 25 corresponden a virus de la gripe A (8 de ellos AH3N2) y 2 corresponden a virus de la gripe B.

Sistemas Centinela: En la semana 52/2006 todas las redes centinela que integran el Sistema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información. En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por periodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal se mantiene baja en todo el territorio vigilado, excepto en Asturias, en donde se señala por primera vez en la temporada una incidencia de gripe que supera el umbral basal epidémico. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 52/2006 continúa manteniéndose por debajo del umbral basal (37,40 casos por 100.000 habitantes).

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La intensidad de la actividad gripal permanece a nivel bajo en Europa. En la semana 51/2006, Suecia notificó un brote regional de gripe, en la parte norte del país, en el que todos los aislamientos correspondieron a virus de la gripe AH3, similar a la cepa vacunal A/Wisconsin/67/2005. Desde el inicio de la temporada 2006-2007 se han detectado un total de 258 casos de gripe A y 18 casos de gripe B confirmados por laboratorio en toda Europa, de los que el 75% fueron notificados por Francia, Suecia, Suiza y Reino Unido. Se han caracterizado 54 aislamientos antigénica y/o genéticamente, de los que 45 fueron similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2); 5 similares a A/California/7/2004(H3), una cepa de A(H3N2) que emergió durante la temporada 2004-2005, circuló durante la temporada 2005-2006, y está muy relacionada con la cepa de referencia A/Wisconsin/67/2005 (H3N2); 3 similares a A/New Caledonia/20/99(H1N1) y 1 similar a B/Malaysia/2506/2004. Varios países han notificado detecciones de VRS al EISS. De forma global el número de detecciones de VRS en Europa es bajo comparado con la semana 51/2005. Mientras que en algunos países las detecciones de VRS son todavía esporádicas o comienzan ahora a aumentar (República Checa), en otros (Francia, Holanda, Reino Unido) se detectan niveles similares a la semana correspondiente de la temporada previa.

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi