

Vigilancia de la gripe en España Semana 15/2008 (6 al 12 de abril de 2008)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 15/2008 continúa la notificación esporádica de aislamientos de virus de la gripe. Los cinco aislamientos centinela señalados proceden de los laboratorios de las redes de Aragón (1B), Baleares (2B), Cataluña (1A, 1B), que corresponden a una tasa de aislamiento viral del 21%. Además, se ha notificado un aislamiento de virus de la gripe B procedente de fuentes no centinela del Laboratorio del Hospital Virgen de las Nieves de Granada (Andalucía). Desde el inicio de la temporada 2007-2008 se han notificado un total de 1664 aislamientos virales de los que un 49% corresponde a virus de la gripe A (60% AH1; 36% AH1N1; 2,3% AH3; 1,7% AH3N2 entre los subtipados), un 51% a virus de la gripe B y un 0,12% a virus de la gripe C.

Año	Semana	Aislamientos centinela								Aislamientos no centinela								Total	VRS
		ANS	AH1	AH1N1	AH1N2	AH3	AH3N2	B	C	ANS	AH1	AH1N1	AH1N2	AH3	AH3N2	B	C		
2007	40-52	54	96	69	0	3	6	26	0	42	37	2	0	1	1	19	0	356	882
2008	1	10	17	9	0	0	0	4	0	23	9	3	0	0	0	7	1	83	107
2008	2	26	39	10	0	0	0	35	0	27	16	9	0	0	0	11	0	173	95
2008	3	10	20	21	0	0	2	44	0	19	21	15	0	0	0	36	0	188	65
2008	4	9	17	12	0	1	0	52	0	6	11	10	0	2	0	24	0	144	63
2008	5	8	6	8	0	0	0	54	0	6	7	4	0	0	0	28	0	121	57
2008	6	4	2	3	0	0	0	60	0	6	1	5	0	4	0	39	1	125	58
2008	7	0	5	3	0	1	0	55	0	7	2	4	0	0	0	45	0	122	19
2008	8	4	6	1	0	0	0	45	0	1	1	0	0	0	0	62	0	120	26
2008	9	3	4	0	0	0	0	31	0	1	0	0	0	0	0	38	0	77	23
2008	10	5	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	30	0	57	22
2008	11	1	0	0	0	0	0	21	0	1	0	0	0	0	0	22	0	45	12
2008	12	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	15	0	20	7
2008	13	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	5	0	13	5
2008	14	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	6	0	14	2
2008	15	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0
Total		137	212	136	0	5	8	466	0	145	105	52	0	7	1	388	2	1664	1443

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 15/2008 todas las redes han enviado información de vigilancia de la gripe a excepción de Canarias. Se sigue observando una estabilidad en las tasas de incidencia de gripe, con valores similares a los observados con anterioridad a la onda epidémica de esta temporada en todas las redes del sistema. La tasa global notificada esta semana disminuye a 11,31 casos por 100.000 habitantes.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2007-2008. Sistemas centinela. España.





PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**

INTERNACIONAL DE LA GRIPE

...a su fin en Europa. En la semana 14/2008 se registran niveles bajos de detecciones virales en todos los países europeos. La difusión de la gripe A es local en Noruega y local en Eslovaquia. La tasa de aislamiento viral de la gripe B continúa siendo predominante (85%). La actividad del virus de la gripe B continúa siendo predominante (85%). Aunque la actividad gripal durante la mayor parte de la temporada 2007-2008 ha estado asociada al virus de la gripe AH1N1, desde la semana 09/2008 ha predominado en Europa la circulación del virus de la gripe B. El balance entre los distintos subtipos del virus de la gripe A está cambiando y se está observando una disminución en el número de detecciones del subtipo AH1 hasta llegar a ser tan poco frecuente como el AH3 (subtipo minoritario a lo largo del periodo epidémico). Desde el inicio de la temporada un 33% corresponden a virus de la gripe A no subtipado, un 30% a virus de la gripe AH1, un 1% a virus de la gripe AH3 y un 36% a virus de la gripe B.

A 9 de abril de 2008 se han notificado virus AH1N1 resistentes a oseltamivir en 19 países europeos con una prevalencia del 23% ([más información](#)).

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi