

## Vigilancia de la gripe en España Semana 04/2006 (22 al 28 de enero de 2006)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe  
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

**Resultados de Laboratorio:** En la semana 04/2006 se han enviado 60 muestras centinela a los laboratorios, en las que se ha aislado un virus de la gripe A de la red de Cataluña. También se han notificado cinco aislamientos de virus A no centinela en los laboratorio de Galicia. La red de Castilla y León ha notificado un aislamiento B centinela correspondiente a la semana 03/2006 y señala en esa semana una actividad gripal esporádica, volviendo a difusión nula en la semana 04/2006. Desde el comienzo de la temporada se han notificado 14 aislamientos en muestras centinela: 9 de virus de la gripe A, de los cuales 1 es AH3N2 y 3 AH1N1, y 5 de virus de la gripe B. En muestras no centinela se han notificado 13 aislamientos: 11 de virus de la gripe A (de los cuales 1 es AH1N1) y 2 de virus de la gripe B. Globalmente, 20 aislamientos corresponden a virus de la gripe A(74%) y 7 a virus de la gripe B (26%).

**Sistemas Centinela:** En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). Todas las redes centinelas que han remitido información hasta el momento señalan niveles bajos de actividad gripal. La tasa global de incidencia notificada de gripe esta semana (32,38 por 100.000 habitantes) se mantiene por debajo de los niveles basales.

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

La actividad gripal permanece baja en Europa; sólo Holanda señala una actividad por encima de sus niveles basales, mientras que todos los demás países notifican un nivel bajo de actividad gripal. Sin embargo, hay señales de que la actividad está aumentando gradualmente. Por primera vez en esta temporada, un país, Francia, notifica una difusión local de su actividad gripal y quince países señalan una difusión esporádica. Además se observa un aumento gradual en el número total de aislamientos positivos semanales. Desde el comienzo de temporada se han detectado en Europa mayor número de virus de la gripe B(64%) que de A(36%). En contraste con el resto de países de Europa, donde se han notificado pocos aislamientos virales, normalmente mezcla de virus A y B, en Escocia y Noruega, se ha registrado un mayor número de aislamientos con un predominio importante de virus de la gripe B. Hasta la semana 03/2006 se han caracterizado antigénica y/o genéticamente: 26 virus A(H1N1)/New Caledonia/20/99, 12 A(H3N2)/California/7/2004, 48 B/Malaysia/2506/2004 (del linaje B/Victoria/2/87) y 6 B/Jiangsu/10/2003 (B/Jiangsu/10/2003 es un virus similar a B/Shanghai/361/2002 del linaje B/Yamagata/16/88, que se usa en la vacuna de esta temporada). No se han notificado casos humanos de infección por virus de la gripe AH5N1 en los 28 países europeos participantes en el EISS en la semana 03/2006. Desde el comienzo de 2006 Turquía, que no participa en el EISS, ha notificado cuatro casos fatales de infección por AH5N1, diecisiete casos adicionales confirmados por laboratorio y más pacientes están bajo investigación.

Ver : [http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin\\_v2.cgi](http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi)