

Vigilancia de la gripe en España Semana 10/2006 (5 al 11 de marzo de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología


Resultados de Laboratorio: En la presente semana se han enviado a los laboratorios 189 muestras centinela. En la siguiente tabla quedan recogidos, desde el inicio de la temporada, los aislamientos semanales procedentes de las muestras centinela. De un total de 265 virus aislados hasta el momento en el conjunto del territorio vigilado, 148 (56%) son tipo A y 117 (44%) son tipo B. De las 70 muestras tipo A que han sido subtipadas, 63 (90%) corresponden a A(H1N1), y 7 (10%) son A(H3N2).

Tabla. Aislamientos de virus de la gripe en muestras centinela. Temporada 2005-2006.

Año	Semana	A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela
2.005	Semana 40-52	0	0	2	2
2.006	Semana 1	0	0	0	0
	2	0	1	1	0
	3	0	0	4	4
	4	0	0	3	2
	5	0	0	2	4
	6	3	0	11	8
	7	4	0	11	17
	8	13	4	14	25
	9	24	1	12	30
	10	34	1	3	25
Total		78	7	63	117

Sistemas Centinela: En la figura exponemos los datos de incidencia de gripe en el territorio sujeto a vigilancia, por períodos semanales, para la temporada anterior y la actual. También quedan recogidos los aislamientos de virus de la gripe en la temporada actual. La actividad gripal evoluciona en España de forma moderadamente epidémica, con cierta disparidad regional entre el norte y el sur del país. Igualmente, hay disparidad en la distribución por edad, con una mayor incidencia de la enfermedad en el grupo de menores de 15 años. La tasa global de incidencia notificada de gripe (139,67 casos por 100.000 habitantes) se mantiene, por segunda semana consecutiva, por encima del límite superior del umbral basal establecido para la actual temporada.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Doce países europeos han notificado, en la semana 9/2006, y respecto a la actividad clínica de la gripe, una intensidad media. En Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Holanda, Irlanda del Norte y Suiza las tasas de incidencia notificadas son elevadas. En Inglaterra y Lituania han descendido.

Desde el inicio de la temporada se han aislado más virus tipo B (68%) que tipo A (32%) en el conjunto del territorio vigilado en Europa. No se han registrado casos humanos de gripe A(H5N1) en los países participantes en EISS.