


Resultados de Laboratorio:

El número de muestras centinela enviado a la red de laboratorios del sistema desciende de forma importante (64 en la semana 14/2006). La circulación de virus gripales A y B, aunque menor, continúa repartida casi por igual: de los 29 aislamientos registrados esta semana, 15 (52%) corresponden al tipo A, y 14 (48%) al tipo B.

Sistemas Centinela:

En la semana 14/2006 continúa la tendencia descendente de la actividad gripal en todo el territorio vigilado. La tasa global notificada (64,47 casos por 100.000 habitantes) desciende por primera vez por debajo del umbral basal establecido para la actual temporada, tras haber estado situado por encima desde la semana 9/2006.. El descenso de las tasas se observa en todos los grupos etarios, siendo más pronunciado en los menores de 15 años.

Figura 1. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la temporada 2005-2006 la epidemia estacional de gripe comenzó tarde en Europa. Desde su inicio, la actividad gripal en el continente ha estado asociada principalmente a la circulación del virus tipo B (62% de los aislamientos). En la semana 13/2006 las tasas han aumentado sólo en dos países (República Checa y Eslovaquia). En el resto están en claro descenso o en niveles basales, indicando que la actividad gripal en Europa está llegando a su fin esta temporada. No se han notificado casos humanos de infección por el virus H5N1 en los países que participan en EISS.