

Vigilancia de la gripe en España Semana 17/2006 (23 al 29 de abril de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio:


En la semana 17/2006 se han enviado 13 muestras centinela a los laboratorios de la red, en las que se han identificado dos virus de la gripe A y uno B (laboratorios de Andalucía y Baleares). De un total de 891 aislamientos virales, desde el inicio de la temporada hasta el momento, 530 (59,5%) son tipo A y 361 (40,5%) son tipo B. De las 189 muestras tipo A que han sido subtipadas, 164 son A(H1N1) (86,7%) y 25 son A(H3N2) (13,2%).

Tabla Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema				A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
Año	2.005	Semana	40-52	0	0	2	2	4	0	0	3
	2.006	Semana	1-9	39	8	62	93	37	2	5	51
			10	27	6	17	41	45	2	3	19
			11	28	2	22	46	37	1	5	22
			12	24	1	23	28	29	0	4	7
			13	20	2	10	20	13	1	0	4
			14	13	0	4	13	7	0	2	5
			15	3	0	4	1	10	0	0	4
			16	2	0	1	1	1	0	0	0
			17	2	0	0	1	0	0	0	0
			Total	158	19	145	246	183	6	19	115

Sistemas Centinela:

En la figura exponemos los datos de incidencia de gripe por períodos semanales, para la temporada anterior y la actual en el territorio sujeto a vigilancia. También quedan recogidos los aislamientos de virus de la gripe en la temporada actual. Todas las redes centinela declarantes siguen señalando un nivel bajo de actividad gripal y la tasa global de incidencia notificada de gripe desciende esta semana a 9,52 casos por 100.000 habitantes, valor similar al observado con anterioridad a la onda epidémica de esta temporada.

Figura 1. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 16/2006 la actividad gripal permanece estable en Eslovenia, mientras que en el resto de países europeos disminuye o vuelve a situarse en niveles basales. El virus de la gripe B ha sido dominante en Europa, representando un 60% del total de detecciones. El número global de aislamientos gripales está disminuyendo y, desde la semana 14/2006, se registra un mayor número de virus de la gripe A que de B. Durante la temporada 2005-2006 la actividad gripal ha sido moderada en gran parte de Europa y siete países (Austria, Alemania, Hungría, Portugal, Escocia, Rumania y Gales) han registrado niveles de actividad gripal muy bajos. Un análisis de la difusión espacial de la actividad gripal en Europa indica que en la temporada 2005-2006 no se ha producido una difusión geográfica significativa oeste-este, como se pudo observar en las anteriores cuatro temporadas (2001-2005). Tampoco se ha observado difusión sur-norte. Hasta la semana 16/2006 no se han detectado casos humanos de gripe AH5N1 en los países europeos participantes en el EISS.

Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi?display=1&code=185&bulletin=185