

## Vigilancia de la gripe en España Semana 50/2006 (10 al 16 de diciembre de 2006)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe  
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

**Resultados de Laboratorio:** En la semana 50/2006, se ha notificado un aislamiento de virus de la gripe A en una muestra centinela procedente de la red de Cataluña y dos aislamientos de virus de la gripe B, en muestras no centinela, procedentes de los laboratorios de Galicia. El aislamiento de virus de la gripe B en una muestra centinela de la semana 48/2006, notificado por el laboratorios de Cataluña, ha sido descartado. Desde el comienzo de la temporada se han notificado un total de 14 aislamientos procedentes de muestras centinela y no centinela: 12 corresponden a virus de la gripe A (4 de ellos AH3N2) y 2 corresponden a virus de la gripe B.

**Sistemas Centinela:** En la semana 50/2006, todas las redes centinela que integran el Sistema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información. En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal se mantiene baja en todas las redes centinela que integran el sistema, aunque se observa una tendencia creciente en las incidencias de gripe registradas en las redes de Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta y La Rioja. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 50/2006 se mantiene por debajo del umbral basal epidémico (28,25 casos por 100.000 habitantes).

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Se mantiene en Europa un nivel bajo de intensidad de actividad gripal. Sólo Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega, Rumania y Suiza, señalan un nivel de difusión esporádico, mientras que otros 22 países permanecen con un nivel nulo de difusión de la actividad gripal. Desde la semana 40/2006 se han notificado aislamientos esporádicos de virus de la gripe. Sin embargo, desde la semana 47 (47/2006 a 49/2006) se ha registrado un incremento en el número de aislamientos positivos semanales de virus de la gripe. Hasta el momento el 92% de los aislamientos virales realizados corresponden a virus de la gripe A. Del total de aislamientos notificados (146, procedentes de fuentes centinela y no centinela), 87 (60%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 9 (6%) a virus AH1 (de los que 3 son AH1N1), 38 (26%) a virus de la gripe AH3 (de los que 18 son AH3N2) y 12 (8%) a virus de la gripe B. Las caracterizaciones genéticas y/o antigénicas de 17 aislamientos, realizadas hasta la semana 49/2006, señalan que 14 corresponden a A/Wisconsin/67/2005(H3N2), 2 a A/New Caledonia/20/99(H1N1) y uno similar a A/California/7/2004(H3N2), una cepa de A(H3N2) que emergió durante la temporada 2004-2005, circuló durante la temporada 2005-2006 y está relacionada cercanamente a la cepa de referencia A/Wisconsin/67/2005 (H3N2).

[http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin\\_v2.cgi](http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi)