

## Vigilancia de la gripe en España Semana 51/2006 (17 al 23 de diciembre de 2006)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe  
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

**Resultados de Laboratorio:** En la semana 51/2006 se han notificado 3 aislamientos de virus de la gripe A en muestras centinela procedentes de las redes de Andalucía, Canarias y Cataluña. Desde el comienzo de la temporada se han notificado un total de 22 aislamientos: 20 corresponden a virus de la gripe A (2 de ellos AH3N2) y 2 corresponden a virus de la gripe B.

**Sistemas Centinela:** En la semana 51/2006 todas las redes centinela que integran el Sistema Centinela para la Vigilancia de la Gripe en España han enviado información a excepción de Asturias. En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por periodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). La actividad gripal se mantiene baja en todas las redes centinela que han declarado datos. A nivel global la tasa de incidencia notificada de gripe en la semana 51/2006 continúa manteniéndose por debajo del umbral basal (27,60 casos por 100.000 habitantes).

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En Europa se mantiene un nivel bajo de intensidad de actividad gripal. Con respecto a la difusión de la actividad gripal, se ha registrado un incremento en el número de países con niveles esporádicos de difusión. Hasta el momento, el 92% de los aislamientos de virus de la gripe realizados corresponden al tipo A. Del total de aislamientos notificados (210, procedentes de fuentes centinela y no centinela), 136 (65%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 14 (7%) a virus AH1 (de los que 3 son AH1N1), 44 (21%) a virus de la gripe AH3 (de los que 19 son AH3N2) y 16 (8%) a virus de la gripe B. Las caracterizaciones genéticas y/o antigénicas de 43 aislamientos señalan que 35 corresponden a A/Wisconsin/67/2005(H3N2), 2 a A/New Caledonia/20/99(H1N1), una a B/Malaysia/2506/2004 y 5 similares a A/California/7/2004(H3), una cepa de A(H3N2) que emergió durante la temporada 2004-2005, circuló durante la temporada 2005-2006, y está muy relacionada con la cepa de referencia A/Wisconsin/67/2005 (H3N2).