

## Vigilancia de la gripe en España Semana 2/2007 (7 al 13 de enero de 2007)


**Grupo de Vigilancia de la Gripe**  
**Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**  
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

**Resultados de Laboratorio:** En la semana 2/2007, los laboratorios del sistema han notificado un total de 26 aislamientos de virus de la gripe A y 1 de virus de la gripe B. Los aislamientos de Asturias (1A) y Cataluña (8A) provienen de muestras no centinelas y los de Navarra (2A y 1B), La Rioja (3A), País Vasco (1A, 3 AH3 y 8 AH3N2) de muestras centinelas. Desde el comienzo de la temporada se ha registrado un total de 85 aislamientos: 46 (54,11%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 30 a virus AH3N2 (35,29%), 4 a virus AH1N1 (4,70%) y 5 a virus de la gripe B (5,88%). La circulación de virus de la gripe A es predominante desde la semana 51/2006.

			Tabla . Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema							
			A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
2.006	Semanas	40-52	10	15	3	0	8	0	0	3
2.007	Semana	1	5	4	1	1	8	0	0	0
		2	6	11	0	1	9	0	0	0
			21	30	4	2	25	0	0	3

**Sistemas Centinela:** En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por periodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 02/2007 la actividad gripal se ha intensificado en España de forma bastante generalizada y la mayoría de las redes señalan un nivel de intensidad medio. La difusión geográfica de la enfermedad es mayor en el norte y noroeste del país, además de Canarias. La tasa global de incidencia notificada de gripe (86,85 por 100.000 habitantes) supera por primera vez el umbral basal establecido para la actual temporada y se inicia claramente esta semana la fase de ascenso de la onda epidémica. En la distribución por grupos de edad se observa un aumento generalizado en las tasas de incidencia de gripe, con menores incrementos en el grupo de mayores de 64 años.

**Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.**



### VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 01/2007 se señala un aumento del nivel de intensidad de la actividad gripal en Grecia, Irlanda del Norte y Escocia, mientras que en el resto de países que integran el EISS la intensidad permanece por debajo del nivel basal. Desde el inicio de la temporada 2006-2007 se han detectado un total de 655 (96%) casos de gripe A y 26 (5%) casos de gripe B confirmados por laboratorio en toda Europa. Se han caracterizado 122 aislamientos antigénica y/o genéticamente, de los que 105 fueron similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2); 8 similares a A/California/7/2004(H3), 8 similares a A/New Caledonia/20/99(H1N1), y uno similar a B/Malaysia/2506/2004.

[http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin\\_v2.cgi](http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi)