

Vigilancia de la gripe en España Semana 13/2007 (25 al 31 de marzo de 2007)

**Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica**

Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología


Resultados de Laboratorio: En la semana 13/2007 continúa la baja notificación de aislamientos de virus de la gripe por las redes del sistema con un total de 7 aislamientos en los que el virus de la gripe B es el predominante. Los aislamientos provienen de las redes de Andalucía (1 A), Comunidad Valenciana (1 AH3N2), Cataluña (4 B) y País Vasco (1 B) y todos, a excepción del de Andalucía, provienen de muestras centinela. Desde el principio de la temporada se ha registrado un total de 1479 aislamientos de virus de la gripe: 677 (46%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 730 (49%) a virus AH3N2, 16 (1,1%) a virus AH1N1 y 56 (3,8%) a virus de la gripe B. En estas dos últimas semanas se ha observado un predominio de virus de la gripe B en población centinela. Esta circulación tardía del virus de la gripe B también se observó en la temporada 2004-2005.

Tabla . Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema

		A	A(H3N2)	A(H1N1)	B	A(H3N2)	A(H1N1)			
		centinela	centinela	centinela	centinela	A otras	otras	otras	B otras	
2006	Semanas	40-52	5	21	2	0	16	3	0	3
2007	Semana	1	3	10	1	1	22	7	0	0
		2	13	34	1	1	47	8	0	0
		3	22	88	4	0	94	22	0	1
		4	34	89	1	1	115	27	0	0
		5	26	95	0	0	29	41	0	0
		6	28	86	2	4	31	37	3	0
		7	38	49	1	2	31	30	0	4
		8	14	26	0	4	47	12	0	1
		9	11	14	1	0	21	7	0	13
		10	6	6	0	0	9	8	0	2
		11	6	5	0	5	4	3	0	3
		12	2	0	0	6	2	1	0	0
		13	0	1	0	5	1	0	0	0
Total		208	524	13	29	469	206	3	27	

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por periodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 13/2007 las tasas de incidencia permanecen estables o experimentan ligeras fluctuaciones en todas las redes centinela, por debajo claramente del umbral basal. La tasa global notificada esta semana es de 22,96 casos por 100.000 habitantes.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 12/2007 la actividad gripal ha finalizado en todos los países que integran el EISS alcanzándose, en casi toda Europa, los niveles detectados en el periodo pre-epidémico. La tasa de incidencia en Dinamarca disminuye tras alcanzar su pico máximo en la semana 10. En 18 de los 27 países de los que se dispone de información actualizada hasta la semana 12/2007 se observan tasas de incidencias superiores a las registradas en la temporada 2005-2006. Este incremento podría deberse a la circulación predominante en la presente temporada del virus A(H3N2). Desde el inicio de la temporada 2006-2007 se han caracterizado antigénica y/o genéticamente 2340 aislamientos, de los que 1737 fueron similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2), 303 similares a A/California/7/2004(H3N2), 176 similares a A/New Caledonia/20/99(H1N1), 114 similares a B/Malaysia/2506/2004 y 10 similares a B/Jiangsu/10/2003.

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgiT