


España reduce casi a la mitad la tasa de infecciones de VIH no diagnosticadas

26/05/2023



El informe se ha desarrollado desde el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en colaboración con el Ministerio de Sanidad ha actualizado las últimas estimaciones realizadas sobre el número de personas que conocen su diagnóstico de VIH en España. **El informe**, realizado por las investigadoras del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII **Victoria Hernando, Olivier Nuñez y Asunción Díaz**, estima que la cifra de personas con VIH no diagnosticadas se ha reducido casi a la mitad (-42,3%) en los últimos cuatro años, pasando del 13% al 7,5%.

Esta evolución sitúa la tasa de personas diagnosticadas de VIH en el 92,5% y posiciona a España en el camino para alcanzar el objetivo del 95% fijado para en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las autoras también pertenecen al Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del ISCIII, en sus áreas de

Enfermedades Infecciosas ([CIBERINFEC](#)) y Epidemiología y Salud Pública ([CIBERESP](#)).

Según los resultados del informe, el 92,5% de las personas que vive con el VIH en España conocería su diagnóstico de infección, el 96,6% está recibiendo tratamiento antirretroviral y el 90,4% tiene la carga viral suprimida. La disminución de la fracción no diagnosticada es el dato que presenta mayor evolución, ya que actualmente, se estima esa tasa en el 7,5% en el periodo 2021-2022, frente al 13% estimado en el periodo 2017-2019. Desde el año 2013, en que se realiza la primera estimación del continuo de atención en España, hasta este momento, el número de personas diagnosticadas de VIH se incrementó en un 12,8%, las personas en tratamiento en un 11,0% y las personas con supresión viral en un 10,9%.

El [Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida \(ONUSIDA\)](#) estableció como objetivo para acabar con la infección por el VIH como problema de salud pública que, en el año 2020, el 90% de las personas con infección por el VIH estuvieran diagnosticadas, de ellas el 90% estuvieran con tratamiento antirretroviral y de éstas el 90% tuviera la carga viral suprimida. Este objetivo, denominado 90-90-90, se ha ampliado hasta el 95-95-95 para el año 2030, como parte de la meta 3 de los [Objetivos de Desarrollo Sostenible \(ODS\)](#).

La importancia del diagnóstico precoz La infección por el VIH no presenta síntomas hasta sus fases finales, de tal modo que una persona puede haber contraído la infección y desconocerlo. Diagnosticar precozmente la infección por el VIH es de vital importancia para que una persona pueda recibir tratamiento antirretroviral de forma temprana, mejorando así su calidad de vida y contribuyendo a cortar la cadena de transmisión. La realización de la prueba de VIH es la mejor manera de reducir la fracción no diagnosticada.

Más información:

- [Consulta el informe completo publicado por el ISCIII \(2021-2022\)](#)
- [Consulta el informe completo publicado por el ISCIII \(2017-2019\)](#)
- Infografía con el continuo de atención del VIH para el periodo 2021-2022