


Casi la mitad de los nuevos casos con infección por VIH en España tienen diagnóstico tardío

01/12/2023



El ISCIII y el Ministerio de Sanidad han publicado esta semana un informe con datos actualizados de vigilancia epidemiológica del VIH/Sida en España, que complementa otro estudio publicado hace unos meses que reveló que España ha reducido casi a la mitad la tasa de infecciones de VIH no diagnosticadas.

El Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos ISCIII (ISCIII), junto al Ministerio de Sanidad y con la colaboración de las comunidades autónomas, **ha publicado un informe** con los últimos datos de vigilancia epidemiológica del VIH y el Sida en España. Los datos, actualizados a 2022, señalan que el año pasado se notificaron 2.956 nuevos diagnósticos de VIH en España, lo que supone una tasa (corregida tras retrasos de notificación) de 7,71 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el estudio revela que el 46,8 de los nuevos diagnósticos, casi la mitad, presentaron un diagnóstico tardío.

Los resultados del citado informe señalan que la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en niveles similares a los de otros países de Europa Occidental, aunque es ligeramente superior a la media de la Unión Europea. La infección por VIH se transmite

mayoritariamente por vía sexual. Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos, por lo que el colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres es prioritario para los programas de prevención.

Los datos señalan que las personas de otros países suponen casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en 2022, por lo que los programas de prevención deben ser diversos en sus actuaciones para adaptarse a las posibles necesidades de este colectivo, social y culturalmente muy heterogéneo y, en ocasiones, especialmente vulnerable. Sobre la tasa de infecciones tardías, las autoras recuerdan que es esencial que la población y los profesionales sanitarios sean conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable al VIH, y que es fundamental diagnosticar la infección lo antes posible.

El informe también confirma que la tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH es descendente a partir de 2017, aunque los descensos observados en casos y tasas en 2020 y 2021 puede estar afectado por la pandemia de COVID19. Respecto a los nuevos casos de sida, la información aportada por el Registro Nacional indica que, tras más de dos décadas de tratamiento antirretroviral eficaz, la reducción de la incidencia de sida en España ha sido muy importante.

Este viernes, como cada 1 de diciembre, se conmemora el **Día Mundial del Sida**, una iniciativa para seguir visibilizando los esfuerzos científicos y sociales contra la infección, y para combatir el estigma que aún rodea a la enfermedad. El ISCIII dedica parte de sus esfuerzos en investigación, financiación, formación, asesoría y prestación de servicios a impulsar la I+D+I y la vigilancia del VIH y el Sida, principalmente desde el Centro Nacional de Epidemiología, que lleva a cabo estudios de vigilancia epidemiológica, y el Centro Nacional de Microbiología, que dispone de una unidad específica de investigación sobre Inmunopatología del Sida.

Más datos sobre diagnóstico

Estos datos se suman a los resultantes de [otro estudio publicado hace unos meses](#), también por el ISCIII y el Ministerio de Sanidad, que actualizó las últimas estimaciones realizadas sobre el número de personas que conocen su diagnóstico de VIH en España. [El informe](#) estima que la cifra de personas no diagnosticadas se ha reducido casi a la mitad (-42,3%) en los últimos cuatro años, pasando del 13% al 7,5%. Esta evolución sitúa la tasa de personas diagnosticadas de VIH

en el 92,5% y posiciona a España en el camino para alcanzar el objetivo del 95% fijado para en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según los resultados de este estudio, el 92,5% de las personas que vive con el VIH en España conocería su diagnóstico de infección, el 96,6% está recibiendo tratamiento antirretroviral y el 90,4% tiene la carga viral suprimida. La disminución de la fracción no diagnosticada es el dato que presenta mayor evolución, ya que actualmente, se estima esa tasa en el 7,5% en el periodo 2021-2022, frente al 13% estimado en el periodo 2017-2019. Desde el año 2013, en que se realiza la primera estimación del continuo de atención en España, hasta este momento, el número de personas diagnosticadas de VIH se incrementó en un 12,8%, las personas en tratamiento en un 11,0% y las personas con supresión viral en un 10,9%.

Nutrida presencia del ISCIII en el Congreso de Gesida

El Día Mundial del Sida ha coincidido esta semana con la celebración del congreso anual de GeSIDA, la principal reunión científica en España sobre el estudio del VIH y el Sida. El ISCIII ha contado con una importante representación de científicas y científicos, de los centros nacionales de Epidemiología y Microbiología, que han presentado en el encuentro diversos estudios e investigaciones. La investigadora de la Unidad de Inmunopatología del Sida del CNM-ISCIII, Mayte Coiras, ha copresidido el congreso.



Foto de familia de las investigadoras e investigadores del ISCIII que han participado en el congreso 2023 de GeSIDA, celebrado esta semana en A Coruña. En primera fila, la primera por la izquierda, aparece Mayte Coiras, investigadora del CNM-ISCIII y copresidenta del encuentro.