

Vigilancia de la gripe en España Semana 3/2007 (14 al 20 de enero de 2007)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 3/2007, los laboratorios del sistema han notificado un total de 82 aislamientos de virus de la gripe, 70 procedentes de fuentes centinela y 12 no centinela. Del total de aislamientos notificados 52 son virus de la gripe A (63,4%), 28 virus AH3N2 (34,1%), 1 virus AH1N1 (1,2%) y 1 de virus de la gripe B (1,2%). Desde el comienzo de la temporada se ha registrado un total de 193 aislamientos: 99 (51,3%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 82 a virus AH3N2 (42,5%), 6 a virus AH1N1 (3,1%) y 6 a virus de la gripe B (3,1%). La circulación de virus de la gripe A y AH3N2 es predominante en nuestro territorio.

Tabla . Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema										
			A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
2.006	Semanas	40-52	6	19	3	0	6	3	0	3
2.007	Semana	1	6	6	1	1	8	3	0	0
		2	17	19	1	1	4	4	0	0
		3	49	20	1	0	3	8	0	1
Total			78	64	6	2	21	18	0	4

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, para la anterior temporada y la actual, en el territorio sujeto a vigilancia (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 03/2007 la mayoría de las redes señalan un incremento en las tasas de incidencia de gripe y la difusión geográfica de la enfermedad se intensifica en el centro y norte del país. Todo ello se traduce en un incremento de la tasa global de incidencia de gripe a 143,63 casos por 100.000 habitantes. En la distribución por grupos de edad el mayor incremento en las tasas de incidencia se registra en los menores de 15 años.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 02/2007 se señala un aumento del nivel de intensidad de la actividad gripal en Grecia, Países Bajos, Irlanda del Norte, España y Suiza, mientras que en el resto de países que integran el EISS la intensidad permanece a niveles basales. La República Checa, Francia, Grecia, Rumanía y España señalan niveles locales de difusión geográfica mientras que los demás países señalan difusión esporádica (12 de ellos) o nula (6 de ellos). Desde el inicio de la temporada 2006-2007 se han detectado un total de 1095 (97%) casos de gripe A y 35 (3%) casos de gripe B confirmados por laboratorio en toda Europa. Se han caracterizado 194 aislamientos antigénica y/o genéticamente, de los que 142 fueron similares a A/Wisconsin/67/2005(H3N2); 38 similares a A/California/7/2004(H3), 13 similares a A/New Caledonia/20/99(H1N1), y uno similar a B/Malaysia/2506/2004. De forma global la actividad gripal se intensifica en Europa, siendo el virus de la gripe A el virus predominante.

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi-