Vigilancia de la gripe en España
Semana 15/2006 (9 al 15 de abril de 2006)

Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio:

En la semana15/2006 se registra un descenso global importante en la circulación de virus de la gripe: de 21 muestras centinela enviadas a los laboratorios de la red, se han confirmado ocho aislamientos virales en los laboratorios de Andalucía y Aragón, seis de virus de la gripe A (cuatro de AH1N1) y dos de virus de la gripe B. El predominio de virus A sobre B, al final de la temporada de gripe estacional, se ha señalado también en otros países europeos en los que había circulado principalmente virus de la gripe B con anterioridad.

Tabla 16. Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema

				A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
Año	2.005	Semana	40-52	0	0	2	2	4	0	0	3
	2.006	Semana	1-9	41	7	61	93	37	2	5	50
			10	32	5	13	41	41	2	2	19
			11	30	2	20	43	26	1	5	14
			12	32	1	15	28	11	0	1	4
			13	24	2	6	17	5	1	0	0
			14	13	0	3	13	2	0	2	1
			15	2	0	4	1	0	0	0	1
		Total		174	17	124	238	126	6	15	92

Sistemas Centinela:

La actividad gripal desciende a 25,18 casos por 100.000 habitantes en la semana 15/2006, situándose de este modo en cifras basales, similares a las del período previo a la onda epidémica, e indicando la práctica finalización de la epidemia de gripe estacional en nuestro territorio. El descenso es generalizado en todas las redes del sistema que registran niveles bajos de actividad gripal, con excepción de Canarias que señala un nivel medio. El mayor descenso en las tasas de incidencia se sigue observando en los menores de 15 años.

Figura 1. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la mayor parte de países europeos la actividad gripal está disminuyendo o se sitúa a niveles basales, indicando que la actividad gripal estacional está finalizando en Europa. Sólo Irlanda del Norte ha registrado un pequeño incremento en su actividad gripal en la semana 14/2006. Durante la temporada 2005-2006, la epidemia estacional de gripe comenzó tarde en la mayoría de países europeos. La actividad gripal ha alcanzado niveles de intensidad moderados y se ha asociado fundamentalmente a la circulación de virus de la gripe B (62% de todas las detecciones). Ha habido también una cocirculación de virus A y B en muchos países y se ha registrado una circulación de virus A más frecuente, pero no predominante, al final de la temporada. Hasta la semana 14/2006 no se han detectado casos humanos de gripe AH5N1 en los países europeos participantes en el EISS.

Ver : http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi
http://www.eurosurveillance.org/ew/2006/060413.asp