


Resultados de Laboratorio: En semana 09/2006 se han notificado un total de 59 aislamientos de virus de la gripe, 28 de virus de la gripe A (1 AH3N2) y 31 de virus de la gripe B. A nivel global, desde el inicio de la temporada, se sigue manteniendo un equilibrio de circulación de virus de la gripe A (predominando AH1N1) y B. En la siguiente tabla quedan recogidos los aislamientos semanales (centinelas y no centinelas) desde el inicio de la temporada. De un total de 242 virus aislados hasta el momento en el conjunto del territorio vigilado, 121 (50%) son tipo A (la mayoría de los subtipados son AH1N1), y 121 (50%) son tipo B.

Tabla. Aislamientos de virus de la gripe por tipo de muestra. Temporada 2005-2006.

				A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras	
Año 2.005	Semana	40-45		0	0	0	0	1	0	0	1	
		46-52		0	0	2	3	0	0	0	2	
	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		0	1	1	0	0	0	0	0	0	
	3		0	0	4	4	1	0	1	0	0	
	4		0	0	3	2	5	0	0	0	1	
	5		0	0	2	4	2	0	0	0	3	
	2.006	Semana	6		6	0	8	8	2	0	1	7
			7		6	0	9	17	0	0	2	12
8				21	3	7	23	1	1	0	4	
9				20	0	0	20	7	1	0	11	
Total				53	4	36	80	22	2	4	41	

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe por períodos semanales para la anterior temporada y la actual, así como aislamientos centinelas de virus de la gripe en la actual temporada, en el territorio sujeto a vigilancia. Persiste una disparidad regional en la actividad gripal señalada por las redes centinela, registrándose un nivel medio de intensidad de la actividad gripal en la zona norte y centro del país (Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid), y en Canarias y Ceuta. El resto de redes señalan un nivel bajo de intensidad de la actividad gripal. En la distribución por edad, la mayor incidencia de la enfermedad corresponde al grupo de menores de 15 años. La tasa global de incidencia notificada de gripe continua aumentando (102,07 por 100.000 habitantes), superando esta semana el umbral basal establecido para la actual temporada.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 08/2006 Lituania registró un nivel alto de intensidad gripal. Doce países, entre ellos España, notificaron una intensidad media y catorce un nivel de intensidad bajo. Varios países europeos mantienen una actividad gripal baja desde el inicio de la temporada: Estonia, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovenia. La difusión de la actividad gripal fue epidémica en Bélgica, Francia, Lituania, Luxemburgo, Holanda y Noruega; regional en España y Suiza; local en cuatro países y esporádica en trece. Para el conjunto de Europa, y desde el inicio de la temporada, se observa una mayor presencia de virus tipo B (68% de los aislamientos) que de tipo A (32%). Ninguno de los 28 países que participan en EISS ha notificado casos humanos de gripe A(H5N1).