

Vigilancia de la gripe en España Semana 16/2007 (15 al 21 de abril de 2007)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 16/2007 los laboratorios de Andalucía y Baleares han notificado un total de cinco aislamientos virales, 3 A no subtipado y 2 B, de los que 1A y 1B provienen de muestras centinela. Los dos aislamientos de Andalucía (2 A no subtipado) corresponden a dos niñas de 1 año. Los tres aislamientos de Baleares (1 A y 2 B) corresponden a una niña de 2 años (1 A no subtipado), un hombre de 27 años (1 B) y una niña de 8 años (1 B). Todos los aislamientos se han registrado en personas no vacunadas. Desde el comienzo de la temporada se han notificado un total de 1526 aislamientos de virus de la gripe: 645 (42,3%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 787 (51,6%) a virus AH3N2, 22 (1,4%) a virus AH1N1 y 72 (4,7%) a virus de la gripe B.

Tabla . Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema									
			A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras
2006	Semanas	40-52	5	25	2	1	16	4	2
2007	Semana	1	3	11	1	0	23	6	0
		2	13	34	1	1	48	7	0
		3	22	88	4	0	95	24	0
		4	34	89	1	1	115	30	0
		5	26	95	0	0	25	45	0
		6	21	93	3	4	28	42	4
		7	27	60	2	2	28	33	0
		8	8	31	1	4	45	14	0
		9	8	17	1	0	20	8	0
		10	5	7	0	0	7	10	0
		11	5	6	0	5	5	3	0
		12	3	0	0	8	2	3	0
		13	0	1	0	6	3	1	0
		14	0	0	0	3	0	0	0
		15	0	0	0	4	2	0	0
		16	1	0	0	1	2	0	0
Total			181	557	16	40	464	230	6

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 16/2007 todas las redes han enviado información. Las tasas de incidencia de gripe permanecen estables en todas las redes centinela, por debajo claramente del umbral basal. Todavía persiste una circulación viral esporádica en el este y sur de España, en las redes de Baleares y Andalucía. La tasa global notificada esta semana es de 8,1 casos por 100.000 habitantes.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

En la semana 15/2007, se siguen registrando en Europa niveles basales de actividad gripal, siendo Holanda el único país que señala difusión regional; nueve países han señalado difusión esporádica y en quince no se registra actividad gripal. Desde el comienzo de la temporada 2006-2007 el virus de la gripe AH3N2 ha sido el virus predominante en los 25 países europeos que ofrecen información sobre subtipado viral, con una mediana de 96% (rango 77-100%). Sin embargo, la distribución viral ha sido diferente en Polonia (81% AH1N1 y 14% AH3N2) y Rumania (45% B, 52% AH3N2 y 3% AH1N1). En la temporada 2006-2007, y a diferencia de temporadas anteriores como la 2002/2003 y la 2005/2006, se ha observado una distribución homogénea a lo largo del continente de los distintos tipos/subtipos virales. Estas diferencias entre temporadas ponen en evidencia la importancia de los análisis geográficos de la distribución de la circulación viral.

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgiT