

Vigilancia de la gripe en España Semana 9/2007 (25 de febrero al 3 de marzo de 2007)


Grupo de Vigilancia de la Gripe
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología

Resultados de Laboratorio: En la semana 09/2007 se registra un descenso considerable en el número total de aislamientos notificados por los laboratorios del sistema. La tasa de aislamiento viral sigue disminuyendo con respecto a la semana anterior. Se han identificado 35 aislamientos de virus de la gripe (21 A no subtipado, 12 AH3N2, 1 AH1N1 y 1 B) que se distribuyen: Andalucía (4 A, 1 AH3N2 y 1 AH1N1); Aragón (2 A); Asturias (5 A y 1 B); Cantabria (2 A); Castilla y León (1 A); Cataluña (1 A); Comunidad Valenciana (5 AH3N2); Murcia (4 A); Navarra (1 A); País Vasco (5 AH3N2) y La Rioja (2 A). Desde el principio de la temporada, hasta la presente semana de vigilancia, se ha registrado un total de 1320 aislamientos de virus de la gripe: 608 (46,1%) corresponden a virus de la gripe A no subtipado, 655 (51%) a virus AH3N2, 16 (1,2%) a virus AH1N1 y 21 (1,6%) a virus de la gripe B, siendo el virus de la gripe AH3N2 el que muestra una circulación mayoritaria.

Tabla . Aislamientos gripe por tipo de muestra. Total sistema			A centinela	A(H3N2) centinela	A(H1N1) centinela	B centinela	A otras	A(H3N2) otras	A(H1N1) otras	B otras
2006	Semanas	40-52	5	21	2	0	15	3	0	3
2007	Semana	1	3	10	1	1	22	7	0	0
		2	13	34	1	1	47	8	0	0
		3	28	83	4	0	94	22	0	1
		4	37	85	1	1	115	27	0	0
		5	24	94	0	0	29	41	0	0
		6	28	84	2	4	20	37	3	0
		7	35	47	1	2	20	30	0	2
		8	18	18	0	5	34	12	0	0
		9	10	11	1	0	11	1	0	1
Total			201	487	13	14	407	188	3	7

Sistemas Centinela: En la figura exponemos datos de incidencia de gripe y aislamientos de virus de la gripe por períodos semanales, en el territorio sujeto a vigilancia centinela (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta). En la semana 09/2007, se registra un descenso generalizado en las tasas de incidencia de gripe en todas las redes centinela, las cuales señalan niveles medios o bajos de intensidad de la actividad gripal. La difusión geográfica de la enfermedad persiste en niveles epidémicos en algunas redes del noroeste de España (Asturias y Castilla y León) y Canarias, mientras que disminuye en el resto del territorio vigilado. La incidencia notificada de gripe a nivel global disminuye a 76,92 casos por 100.000 habitantes. En general se puede afirmar que, aunque el virus de la gripe continua circulando en España, el periodo epidémico de esta temporada se acerca a su finalización.

Figura. Gripe. Tasa de incidencia semanal y aislamientos virales. Temporada 2006-2007. Sistemas centinela. España.



VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LA GRIPE

Tras el aumento de actividad gripal registrado en el sur y este de Europa, durante los meses de Enero y Febrero, en la semana 08/2007 son los países del norte los que registran este incremento. La difusión geográfica de la enfermedad es todavía máxima en casi toda Europa, aunque la actividad gripal está decreciendo en la mayoría de países del sur y oeste de Europa. De forma global en Europa la actividad gripal parece haber sobrepasado el pico de la onda epidémica de la temporada, ya que el número de aislamientos gripales positivos está disminuyendo desde la semana 07/2007. Continúa la circulación predominante de virus de la gripe A(H3N2).

http://www.eiss.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi

T